

28
сентября
2026 года



Единый день здоровья



К сведению:

По данным
ВОЗ:

бешенство распространено на территориях большинства стран мира;

ежегодно в мире от бешенства умирает десятки тысяч человек, причем 40% из них – дети до 15 лет.

Обратите
внимание:

В Республике
Беларусь:

вирус бешенства активно циркулирует среди диких плотоядных животных, в том числе бродячих кошек и собак. Именно они являются основным источником заражения для человека;

ежегодно регистрируются случаи бешенства среди диких (лисы, енотовидные собаки, волки и др.), домашних (собаки, кошки) и сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот), поэтому существует риск возникновения случаев бешенства среди населения, которое контактирует с данными животными в быту.

В Гродненской
области:

в 2025 году было выявлено 12 случаев бешенства у животных; за 6 месяцев 2026 года – 15 случаев.

Всемирный день борьбы против бешенства

28 сентября отмечается Всемирный день борьбы с бешенством. Дата выбрана не случайно – это день памяти Луи Пастера, создателя первой вакцины против бешенства, которая была успешно применена в 1885 году. С тех пор наука ушла далеко вперед, но главная задача остаётся прежней: донести до каждого простую истину – бешенство можно предупредить.

В 2026 году Всемирный день борьбы с бешенством проходит под девизом «Вместе мы сильнее». Это напоминание о том, что толь-

ко объединив усилия – медицинских и ветеринарных работников, государство и каждого из нас – можно победить эту болезнь.

Бешенство – это инфекционная болезнь с преимущественным поражением центральной нервной системы, сопровождающаяся судорогами, спазмами глоточной и дыхательной мускулатуры, часто со смертельным исходом. Когда вирус поражает центральную нервную систему и появляются клинические симптомы, бешенство приводит к летальному исходу в 100% случаев.

Вирус бешенства содержится в слюне больного животного. При укусе вместе со слюной вирус попадает в рану. Очень опасно попадание слюны больного животного на слизистые оболочки глаз, рта, носа, а также на кожу, где могут быть невидимые простым глазом повреждения. Среди людей заболевания бешенством распространяют обычно домашние животные. Особую опасность представляют бродячие собаки и кошки.

Наличие случаев бешенства среди животных может способствовать возникновению случаев заболевания среди людей.

Профилактика бешенства

Для предупреждения заражения бешенством необходимо:

минимизировать контакты с бродячими и дикими животными, особенно проявляющими агрессию;

не покупать животных «с рук», без наличия соответствующих документов;

соблюдать правила содержания домашних животных (своевременно проводить профилактическую вакцинацию против бешенства, выгуливать домашних животных при наличии поводка и намордника);

при заболевании животного, либо при появлении симптомов, не исключая бешенства, а также в случаях изменения поведения домашнего животного, получения им повреждений от другого животного, смерти без видимых на то причин обязательно обращаться к ветеринарному специалисту для установления 10

дневного наблюдения за животным или выяснения причины его смерти;

запрещается приносить домой диких животных. Как правило, здоровые дикие животные избегают встречи с человеком. И если такое животное появляется в населенном пункте, можно предположить, что оно больно бешенством. Нужно принять все меры личной предосторожности и обеспечения безопасности для себя и своих близких;

не рекомендуется забирать с улицы бродячих либо больных животных, но если взяли, то найти возможность в короткий срок показать питомца ветеринарному врачу и сделать ему профилактическую прививку против бешенства.

Меры профилактики бешенства обязательны для всех возрастных групп населения, но особенно важно объяснить их детям и подросткам. Они часто проявляют интерес к



бездомным животным, а потому находятся в группе риска.

В случаях, когда контакта с животным не удалось избежать (оцарапывание, укус, ослепление), необходимо:

провести первичную обработку места контакта – тщательно промыть струей воды с мылом;

при наличии раны – после промывания с мылом обработать края раны 5% настойкой йода;

наложить стерильную повязку и немедленно (в течение суток после контакта) обратиться в медицинское учреждение. Только врач (хирург, травматолог) оценит риск возможного заражения бешенства и назначит, при необходимости, прививочный курс.

